

Wszystkie kolczyki, którymi przekłuwamy zostały wykonane z materiałów spełniających normy określone Dyrektywą Unijną [76/769/EEC]: chirurgiczny tytan Grade-23, Grade-5 i Bioplast.

Wszystkie zamieszczone poniżej wskazówki dotyczące procesu pielęgnacji zostały skonsultowane z lekarzami specjalistami.

W przypadku jakichkolwiek komplikacji należy niezwłocznie zgłosić się do studia celem konsultacji z piercerem.

W przypadku każdego świeżo przekłutego miejsca **nie należy**:

- „bawić się” kolczykiem,
- kąpać w ogólnodostępnych zbiornikach wodnych (basen, jezioro, morze, itp.),
- dotykać nieumytymi uprzednio rękoma rany po przekłuciu,
- zdrapywać zaschniętej limfy lub krwi (a jedynie zwilżyć płynem, a następnie usunąć patyczkiem higienicznym),
- używać innych środków do pielęgnacji niż zalecane przez studio (w tym Trybiotyku),
- korzystać z solarium przez okres około 14-21 dni (nie dotyczy języka),
- samodzielnie wymieniać kolczyka przed zagojeniem się przekłutego miejsca.

## **WARGA**

W trakcie gojenia (około 1 miesiąca) należy:

- przemywać ranę z zewnątrz płynem „Octenisept” minimum 3 razy dziennie,

- płukać jamę ustną „Corsodylem” lub „Dentoseptem”,
- ograniczyć spożycie produktów mlecznych i słodczy oraz pokarmów pikantnych i gorących,
- sprawdzać, czy opuchlizna nie pochłania kolczyka.

Nie należy:

- palić papierosów,
- spożywać alkoholu.

## **JĘZYK**

W trakcie gojenia (7-14 dni) należy:

- płukać jamę ustną „Corsodylem” lub „Dentoseptem”,

Nie należy:

- palić papierosów,
- spożywać alkoholu, produktów mlecznych, słodczy, posiłków gorących i pikantnych,
- uprawiać seksu oralnego.

Po upływie około 14-21 dni należy zgłosić się do studia celem wymiany kolczyka na krótszy.

## **NOS**

W trakcie gojenia (1 miesiąc) należy:

- przemywać ranę, tak z zewnątrz, jak i wewnątrz płynem

„Octenisept” minimum 3 razy dziennie,

- zachować ostrożność podczas wycierania twarzy ręcznikiem oraz ubierania i rozbierania się.

Nie należy:

- decydować się na przekłucie nosa po przebytej niedawno operacji plastycznej,

- decydować się na przekłucie podczas przeziębienia lub, w przypadku alergików - kataru siennego.

## **BREW/ BRIDGE**

W trakcie gojenia (1-2 miesiące) należy:

- przemywać ranę płynem „Octenisept” minimum 3 razy dziennie,

- sprawdzać, czy opuchlizna nie pochłania kolczyka,

- zachować ostrożność podczas wycierania twarzy ręcznikiem oraz ubierania i rozbierania się.

Jeżeli nastąpią po przekłuciu bóle głowy (BRIDGE) należy niezwłocznie zgłosić się do studia.

## **USZY**

W trakcie gojenia (płatek ucha 1-2 tygodnie, chrząstka 1-3 miesiące) należy:

- przemywać przekłute miejsce płynem „Octenisept” minimum 3 razy dziennie,

- sprawdzać, czy opuchlizna nie pochłania kolczyka.

## **PEPEK**

W trakcie gojenia (1-6 miesięcy) należy:

- przemywać ranę płynem „Octenisept” minimum 3 razy dziennie,
- do kąpieli stosować mydło antybakteryjne „Protex”,
- zachować ostrożność podczas wycierania ręcznikiem oraz ubierania i rozbierania się.

Nie należy:

- brać długich kąpieli (zaleca się krótki prysznic),
- ćwiczyć mięśni brzucha przez okres około 2 tygodni.

## **SUTKI**

W trakcie gojenia (1-2 miesiące) należy:

- przemywać ranę płynem „Octenisept” minimum 3 razy dziennie,
- zachować ostrożność podczas wycierania ręcznikiem oraz ubierania i rozbierania się.
- do kąpieli stosować mydło antybakteryjne „Protex”.

Nie należy:

- nosić bielizny obcisłej lub wykonanej ze sztucznych tkanin.

## **INTYMNE**

W trakcie gojenia (do 1 miesiąca) należy:

- przemywać ranę płynem „Octenisept” lub „Tantum Rosa” po każdym wyjściu z toalety,
- używać do kąpieli mydła antybakteryjnego „Protex”,
- mieć własny ręcznik (przeznaczony tylko do miejsc intymnych),
- powstrzymać się od współżycia seksualnego do czasu zagojenia przekłucia.

Nie należy:

- robić jakichkolwiek nasiadówek, w tym z ciepłego wywaru z rumianku,
- nosić obcisłej bielizny wykonanej ze sztucznych tkanin .

## **SURFACE BARBELLS / MICRODERMALS**

W trakcie gojenia (1-2 miesiące) należy:

- przemywać ranę płynem „Octenisept” minimum 3 razy dziennie,
- do kąpieli / mycia stosować mydło antybakteryjne „Protex”,
- zachować ostrożność podczas wycierania ręcznikiem oraz ubierania i rozbierania się.

W przypadku jakichkolwiek komplikacji należy niezwłocznie zgłosić się do studia celem konsultacji z piercerem.